



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่อาจระบาด ประจำปี 2565 "กำจัดยุงลาย ลดป่วยตาย ด้วยไข่เลือดออก"

ด้วยสถานการณ์ไข้เลือดออก พ.ศ.2565 ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 305 ราย อัตราป่วย 0.46 ต่อประชากรแสนคน เฉพาะในเดือนมกราคม พบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ประกอบกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 1 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในช่วงฤดูฝน (ม.ย.-ก.ย.) อาจมีผู้ป่วยสูงถึง 10,000-60,000 รายต่อเดือน ประกอบกับมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วย COVID-19 มีการติดเชื้อโรคติดต่อที่อาจระบาดร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก อาจทำให้มีอาการรุนแรง ส่งผลให้การรักษายาก และโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตมีมากขึ้นและมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่อาจระบาด ดังนี้ 1) มอบหมายให้บุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงาน สถานศึกษา และสถานที่ในสังกัด โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจต้องใช้ร่วมกัน เช่น ไฟฉาย ควรมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้งานเสมอ และควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานด้วย, 2) ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยพิจารณาดำเนินการผ่านช่องทางที่เหมาะสมในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เช่น สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรมออนไลน์ เป็นต้น, 3) สื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงานดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองรวมทั้งให้คำแนะนำ หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แนะนำให้ทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ และให้หลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน ไดโครฟีแนค เป็นต้น